

Broiler Clinacox

Art. Nr. 6756

მინერალური საკვები ბროილერისთვის

შემადგენლობა:

მონოკალციუმფოსფატი, ნატრიუმქლორიდი, D-L მეთიონინი, L-ლიზინ-მონოჰიდროქლორიდი, ქოლინ ქლორიდი, ფიტაზა, მინერალებისა და მიკროელემენტების პრემიქსი.

ხარისხობრივი მახასიათებლები:

8,0 % კალციუმი, 10,0 % ნატრიუმი, 11,0% ფოსფორი, 10,0 % მეთიონინი, 10,0% მეთიონინი+ცისტინი, 2,0% ლიზინი.

შემადგენელი ნივთიერებები/კგ:

კვებითი დანამატები: 665.000 i.E. ვიტამინი A (3a672a), 200.000 i.E. ვიტამინი D3 (E 671), 3.500 მგ ვიტამინი E / ალფა-ტოკოფეროლაცეტატი (3a700), 200 მგ ვიტამინი K3, 200 მგ ვიტამინი B1, 600 მგ ვიტამინი B2, 400 მგ ვიტამინი B6 / პიროდიქსინჰიდროქლორიდი (3a831), 2.000 µg ვიტამინი B12, 1.000 მგ კალციუმ-D-პანტოთენატი (3a841), 3.000 მგ ნიკოტინის მჟავა (3a314), 100 მგ ფოლის მჟავა (3a316), 14.000 µg ბიოტინი (3a880), 15.600 მგ ქოლინ ქლორიდი (3a890), 4.000 მგ რკინა (E 1) როგორც რკინის-(II)-სულფატ მონოჰიდრატი, 5.000 მგ თუთია (E 6) როგორც თუთიის ოქსიდი, 6.000 მგ მანგანუმი (E 5) როგორც მანგანუმის(II)-ოქსიდი, 700 მგ სპილენძი (E 4) როგორც სპილენძის-(II)-სულფატ პენტაჰიდრატი, 100 მგ იოდი (E 2) როგორც გაუწყლოებული კალციუმის იოდატი, 20 მგ სელენი (E 8) როგორც ნატრიუმის სელენიტი.

ზოოტექნიკური დანამატები: 50.000 FYT 6-ფიტაზა EC 3.1.3.26 (E 1614 (i))

კოკციდიოსტატიკა: 67 მგ დიკლაზურილი (5 1 771)

Broiler Clinacox-ის გამოყენების წესი

ეს მინერალური საკვები არის 1,5% -იანი.1,5% Broiler Clinacox + 1,6% კირი შეურთეთ სხვა ინგრედიენტებთან ერთად.

რეკომენდირებული რაციონი ზეთით და ცხიმით:

პირველი ფაზა 0-21 დღე

Broiler Clinacox 1,5%

კირი 1,5%

სიმინდი/ხორბალი 58%

სოიოს შროტი 37%

ზეთი 2%

მეორე ფაზა 21 – 35 დღე:

Broiler Clinacox 1,5%

კირი 1,5%

სიმინდი/ხორბალი 63%

სოიოს შროტი 32%

ზეთი 2%

მესამე ფაზა 36–ე დღიდან:

Broiler Clinacox 1,5%

კირი 1,5%

სიმინდი/ხორბალი 68%

სოიოს შროტი 27%

ზეთი 2%

რეკომენდირებული რაციონი ზეთის და ცხიმის გარეშე:

პირველი ფაზა 0-21 დღე

Broiler Clinacox 1,5%

კირი 1,5%

სიმინდი/ხორბალი 62%

სოიოს შროტი 35%

მეორე ფაზა 21 – 35 დღე:

Broiler Clinacox 1,5%

კირი 1,5%

სიმინდი/ხორბალი 67%

სოიოს შროტი 30%

მესამე ფაზა 36–ე დღიდან:

Broiler Clinacox 1,5%

კირი 1,5%

სიმინდი/ხორბალი 72%

სოიოს შროტი 25%

გამოიყენეთ მხოლოდ ბროილერის საკვებში.

დიკლაზურილის გამოყენება დაუშვებელია სხვა კოკციდიოსტატიკთან ერთად.