

Chicki Starter

Art. Nr. 6829

მზა საკვები ბროილერისთვის

შემადგენლობა:

სიმინდი, სოიოს შროტი, კალციუმის კარბონატი, მცენარეული ზეთი (რაფსის ზეთი), მონოკალციუმის ფოსფატი, ნატრიუმის ქლორიდი

ხარისხობრივი მახასიათებლები:

22.0% ნედლეული ცილა, 1.2% ნედლეული ცხიმი, 3.3% ნედლი ბოჭკო, 7.0% ნედლეული ნაცარი, 1.15 ლიზინი, 0.85% მეთ./ცისტინი, 0.5% მეთიონინი, 0.9% კალციუმი, 0.6% ფოსფორი, 0.15% ნატრიუმი, 0.15% მაგნიუმი, 12.0 MJ ME ფრინველი.

შერმადგენელი ნივთიერებები/კგ:

კვებითი დანამატები: 10,000 ი.ს. ვიტამინი A (3a672a), 5000 i.E. ვიტამინი D3 (E 671), 100 მგ ვიტამინი E / ალფა-ტოკოფეროლის აცეტატი (3a700), 4 მგ ვიტამინი K3, 4 მგ ვიტამინი B1, 12 მგ ვიტამინი B2, 8 მგ ვიტამინი B6 / პიროდოქსინის ჰიდროქლორიდი (3a831), 40 µg ვიტამინი B12, 20 მგ კალციუმის D- პანთოტენატი (3a841), 45 მგ ნიაცინი (3a314), 2 მგ ფოლიუმის მჟავა, 200 მკგ ბიოტინი (3a880), 600 მგ ქოლინის ქლორიდი (3a890), 40 მგ რკინა (E 1) როგორც რკინა (II) სულფატის მონოჰიდრატი, 100 მგ თუთია (E 6), როგორც თუთია ოქსიდი, 70 მგ მანგანუმი (E 5) როგორც მანგანუმი (II) ოქსიდი, 14 მგ სპილენძი (E 4) როგორც სპილენძი (II) სულფატი პენტაჰიდრატი, 1 მგ იოდი (E 2) როგორც კალციუმის იოდატის უწყლო, 0.2 მგ სელენი (E 8) როგორც ნატრიუმის სელენიტი.

ზოოტექნიკური დანამატები: 750 FYT 6-Phytase EC 3.1.3.26 (E 1614 (i))

კოკციდიოსტატები: 1 მგ დიკლაზურილი (51 771)

Chicki Starter-ის გამოყენების წესი

Chicki Starter არის მზა საკვები. მისი გამოყენება რეკომენდირებულია მუდმივად დღიურ რაციონში. წიწილებისთვის ზრდის პერიოდში 3 - 4 კვირის განმავლობაში.

პროდუქტი დამატებით შეიცავს იონოფორული ჯგუფის დიკლაზურილს, კარანტინის პერიოდი: 1 დღე.